

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

7 dni przed badaniem:

- Należy przerwać przyjmowanie preparatów żelaza
- Osoby przyjmujące preparaty antyagregacyjne (*Aspiryna, Acard, Ticlid, Acesan, Polopiryna, Aclotin, Ticlo, Plavix itp.*) powinny przestać je przyjmować po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym.
- Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe (*Sintrom, Syncumar, Acenocumarol, Warfaryna, Eliquis, Pradaxa, Xarelto*) powinny koniecznie skonsultować z lekarzem prowadzącym leczenie przeciwzakrzepowe w celu zmiany tych leków na heparyny drobnocząsteczkowe.
- Stosować lekkostrawną, płynną dietę. Nie spożywać żadnych produktów zawierających pestki, mak i nasiona.

3 dni przed badaniem:

- Nie należy spożywać świeżych owoców, warzyw, ziarnistego pieczywa i innych produktów z dużą zawartością błonnika. Można spożywać takie produkty jak buliony, kisiele, kleiki, ryż, białe pieczywo, klarowne płyny niegazowane. Nie spożywać czerwonych produktów (buraczki, grejfrut, granat, wieprzowina).

1 dzień przed badaniem:

- Płynna dieta.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA	
EZICLEN	<p>Jedną butelkę preparatu Eziclen wlewamy do dołączonego kubka i uzupełniamy wodą do kreski zaznaczonej na kubku (0,5 litra). Lek spokojnie wypijamy w przeciągu 30-60 minut. Następnie w ciągu godziny wypijamy jeszcze 1 litr wody niegazowanej. W identyczny sposób przyjmujemy drugą dawkę leku i wypijamy 1 litr wody.</p> <p>Informacje dotyczące przygotowania do badania udzielane są w Rejestracji Pracowni Badań Endoskopowych.</p>